

*Jihoamerická oblast:*

- 1 Amazoňan zelenolící
- 2 Amazoňan kubánský
- 3 Ara malý
- 4 Ara arakanga
- 5 Ara ararauna
- 6 Aratinga červenolící
- 7 Papoušek bělobřichý
- 8 Amazoňan oranžovokřídlý
- 9 Papoušek černouchý
- 10 Papoušek smaragdový
- 11 Papoušek patagonský

poušci žako a papoušci etiopští, na Madagaskaru zase vaza velký a vaza malý. V dešt-  
ných lesích tichomořské oblasti se vyskytují  
papoušci černoramenní.



Mezi tropickými deštnými lesy a poušťmi se  
**SAVANY** rozprostírají savany. Střídají se  
zde období sucha a období dešťů.

Teploty nejsou tak stálé jako v deštném lese. Kolísají  
mezi 40 a 10 °C. Typickými obyvateli tohoto klimatického pásma  
v Austrálii jsou loriové. Zatímco loriové žlutoskrvní nebo loriové  
mnohobarví vyhledávají vlhké savany, v sušších savanách žijí kaka-  
duové naholící, kakaduové inka, korely chocholaté a andulky vlnko-  
vané. Typickými ptáky afrických savan jsou papoušci (agapornisové)  
etiopští. V jihoamerické savaně, například v Argentině, se vyskytují  
aratinga dlouhoocasý a aratinga černoskrvný. Ti se při hledání po-  
travy často spojují do velkých hejn.



PŘEDNÍ INDIE

ZADNÍ INDIE

FILIPÍNY

SUMATRA

JÁVA

NOVÁ GUINEA

AUSTRÁLIE

MADAGASKAR

NOVÝ ZÉLAND

- Afro-asijská oblast:*
- 12 Papoušek senegalský
  - 13 Papoušek konžský
  - 14 Papoušek žako (p. šedý)
  - 15 Papoušek Meyerův
  - 16 Papoušek (agapornis) růžovohrdlý
  - 17 Papoušek (agapornis) růžovohlavý
  - 18 Papoušek (agapornis) škraboškový
  - 19 Vaza malý
  - 20 Alexandr černohlavý
  - 21 Alexandr rudohlavý
  - 22 Alexandr velký
  - 23 Alexandr čínský

- Tichomořská oblast:*
- 24 Papoušek (mada) korunkatý
  - 25 Lori ozdobný
  - 26 Lori červený
  - 27 Papoušek (mada) černoramenný
  - 28 Kakadu arový
  - 29 Tricha orlí
  - 30 Kakadu inka
  - 31 Kakadu růžový
  - 32 Kakadu havraní
  - 33 Kakadu žlutočelý
  - 34 Kakadu naholící
  - 35 Kakadu přílbový
  - 36 Kakapo soví
  - 37 Nestor kea

Zatímco jmenované druhy žijí převážně v nížinách, specializovaly se některé jiné druhy na vyšší oblasti. Typickým „horalem“ je lori papuánský. Horské lesy Nové Guineje osidluje ve výšce až 3500 m n. m. V horských lesích Austrálie žije – alespoň v létě – kakadu přílbový a na Novém Zélandu nestor kea. Rekord ovšem drží jihoamerický papoušek andský – byl viděn ve vysokohorských oblastech ve výšce nad 6000 m n. m.

**HORY**